

BREATH TEST: LA SALUTE IN UN SOFFIO

LATTOSIO	UREA (HP)																																										
<p>Permanenza in laboratorio per circa 4 ore</p>	<p>Permanenza in laboratorio per circa 30 minuti</p>																																										
<p>Il Breath Test al Lattosio è un test molto semplice che comporta la permanenza in laboratorio per quattro ore. Al fine di garantire l'adeguata accuratezza del test deve seguire le istruzioni di seguito indicate:</p>	<p>L'Urea Breath Test è un metodo rapido, specifico, sensibile, non invasivo per valutare la presenza di Helicobacter Pylori (HP) nella mucosa gastrica.</p>																																										
<ul style="list-style-type: none"> non deve aver assunto antibiotici nelle ultime 2 settimane; non deve aver assunto fermenti lattici o lassativi o praticato clisteri di pulizia intestinale nell'ultima settimana (in caso di dubbi porti con sé le confezioni dei farmaci assunti o la prescrizione del medico curante); 	<p>COME FUNZIONA Durante l'esecuzione del test Le verrà chiesto di raccogliere un campione di espirato 30 minuti dopo aver bevuto una soluzione contenente urea.</p>																																										
<ul style="list-style-type: none"> il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con: 	<p>PREPARAZIONE PRIMA DELL'ESAME</p>																																										
<p>COLAZIONE: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi.</p>	<p>Il paziente non deve assumere antibiotici associati e inibitori della pompa protonica nelle tre settimane precedenti l'esame ed alcun farmaco gastroprotettore nell'ultima settimana prima dell'esame. Deve essere a digiuno da 6 ore se adulto, da 3 ore se bambino.</p>																																										
<p>PRANZO: pasta comune o riso conditi con olio e un cucchiaino di grana (N.B.: il parmigiano reggiano non contiene lattosio) oppure pastina in brodo vegetale, a scelta carne o pesce ai ferri conditi con olio.</p>	<p>ELENCO FARMACI GASTROPROTETTORI</p>																																										
<p>POMERIGGIO: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi.</p>	<table border="0"> <tr> <td>ANTRA (Omeprazolo)</td> <td>PARIET (Rabeprazolo)</td> </tr> <tr> <td>AXAGON (Esomeprazolo)</td> <td>PEPTAZOL (Pantoprazolo)</td> </tr> <tr> <td>BIOMAG (Cimetidina)</td> <td>RANIBEN (Ranitidina)</td> </tr> <tr> <td>BRUMETIDINA (Cimetidina)</td> <td>RANIBLOC (Ranitina)</td> </tr> <tr> <td>CITIMID (Cimetidina)</td> <td>RANIDIL (Ranitidina)</td> </tr> <tr> <td>CRONIZAT (Nizatidina)</td> <td>RANIDIZ (Ranitidina)</td> </tr> <tr> <td>DINA (Cimetidina)</td> <td>STOMET (Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>EURECEPTOR (Cimetidina)</td> <td>TAGAMET (Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>FAMODIL (Famotidina)</td> <td>TEMIC (Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>GASTRIDIN (Famotidina)</td> <td>ULCEDIN (Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>LANSOX (Lansoprazolo)</td> <td>ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>LEBLON (Pirenzepina)</td> <td>ULCEX (Ranitidina)</td> </tr> <tr> <td>LIMPIDEX (Lansoprazolo)</td> <td>ULCODINA (Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>LOSEC (Omeprazolo)</td> <td>ULCOMEDINA (Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>MEPRAL (Omeprazolo)</td> <td>ULIS (Cimetidina)</td> </tr> <tr> <td>NIZAX (Nizatidina)</td> <td>ZANIZAL (Nizatidina)</td> </tr> <tr> <td>NOTUL (Cloridrato di Cimetidina)</td> <td>ZANTAC (Ranitidina)</td> </tr> <tr> <td>OMEPRAZEN (Omeprazolo)</td> <td>ZOTON (Lansoprazolo)</td> </tr> <tr> <td>PANTECTA (Pantoprazolo)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PANTOPAN (Pantoprazolo)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PANTORC (Pantoprazolo)</td> <td></td> </tr> </table>	ANTRA (Omeprazolo)	PARIET (Rabeprazolo)	AXAGON (Esomeprazolo)	PEPTAZOL (Pantoprazolo)	BIOMAG (Cimetidina)	RANIBEN (Ranitidina)	BRUMETIDINA (Cimetidina)	RANIBLOC (Ranitina)	CITIMID (Cimetidina)	RANIDIL (Ranitidina)	CRONIZAT (Nizatidina)	RANIDIZ (Ranitidina)	DINA (Cimetidina)	STOMET (Cimetidina)	EURECEPTOR (Cimetidina)	TAGAMET (Cimetidina)	FAMODIL (Famotidina)	TEMIC (Cimetidina)	GASTRIDIN (Famotidina)	ULCEDIN (Cimetidina)	LANSOX (Lansoprazolo)	ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina)	LEBLON (Pirenzepina)	ULCEX (Ranitidina)	LIMPIDEX (Lansoprazolo)	ULCODINA (Cimetidina)	LOSEC (Omeprazolo)	ULCOMEDINA (Cimetidina)	MEPRAL (Omeprazolo)	ULIS (Cimetidina)	NIZAX (Nizatidina)	ZANIZAL (Nizatidina)	NOTUL (Cloridrato di Cimetidina)	ZANTAC (Ranitidina)	OMEPRAZEN (Omeprazolo)	ZOTON (Lansoprazolo)	PANTECTA (Pantoprazolo)		PANTOPAN (Pantoprazolo)		PANTORC (Pantoprazolo)	
ANTRA (Omeprazolo)	PARIET (Rabeprazolo)																																										
AXAGON (Esomeprazolo)	PEPTAZOL (Pantoprazolo)																																										
BIOMAG (Cimetidina)	RANIBEN (Ranitidina)																																										
BRUMETIDINA (Cimetidina)	RANIBLOC (Ranitina)																																										
CITIMID (Cimetidina)	RANIDIL (Ranitidina)																																										
CRONIZAT (Nizatidina)	RANIDIZ (Ranitidina)																																										
DINA (Cimetidina)	STOMET (Cimetidina)																																										
EURECEPTOR (Cimetidina)	TAGAMET (Cimetidina)																																										
FAMODIL (Famotidina)	TEMIC (Cimetidina)																																										
GASTRIDIN (Famotidina)	ULCEDIN (Cimetidina)																																										
LANSOX (Lansoprazolo)	ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina)																																										
LEBLON (Pirenzepina)	ULCEX (Ranitidina)																																										
LIMPIDEX (Lansoprazolo)	ULCODINA (Cimetidina)																																										
LOSEC (Omeprazolo)	ULCOMEDINA (Cimetidina)																																										
MEPRAL (Omeprazolo)	ULIS (Cimetidina)																																										
NIZAX (Nizatidina)	ZANIZAL (Nizatidina)																																										
NOTUL (Cloridrato di Cimetidina)	ZANTAC (Ranitidina)																																										
OMEPRAZEN (Omeprazolo)	ZOTON (Lansoprazolo)																																										
PANTECTA (Pantoprazolo)																																											
PANTOPAN (Pantoprazolo)																																											
PANTORC (Pantoprazolo)																																											
<p>CENA: riso condito con olio e 1 cucchiaino di grana, uova, carne o pesce ai ferri.</p>																																											
<p>BEVANDE: acqua naturale o minerale non gassata, the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati.</p>																																											
<ul style="list-style-type: none"> dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame il paziente DEVE osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua); 																																											
<ul style="list-style-type: none"> dalle ore 7.00 del giorno dell'esame il paziente DEVE bere due bicchieri d'acqua, restare a digiuno, non fumare, lavarsi i denti ed eseguire risciacqui della cavità orale per 2 minuti con collutorio a base di clorexidina 0,2 %, non svolgere attività fisica. 																																											
<p>Durante l'esecuzione del test Le verrà chiesto di raccogliere dei campioni di espirato prima e ad intervalli regolari di 30' dopo aver bevuto una soluzione contenente 25 g di lattosio Durante l'esecuzione dell'esame non potrà consumare alcun cibo (compresi chewing-gum e caramelle), fumare, dormire o eseguire attività fisica; dovrà riferire al personale di Laboratorio eventuali sintomi insorti durante l'esecuzione del breath test con l'ora esatta in cui si sono verificati.</p>																																											
<p>Al termine dell'indagine potrà riprendere l'alimentazione usuale e riprendere le sue normali occupazioni.</p>	<p>le nostre attenzioni per la tua salute non finiscono qui, gira il volantino</p> 																																										