

BREATH TEST: LATTOSIO - GLUCOSIO - LATTULOSIO - UREA (HP)

LATTULOSIO

permanenza in laboratorio per circa 4 ore

Il paziente, al fine di garantire l'adeguata accuratezza del test, deve eseguire le istruzioni di seguito indicate:

4 settimane prima dell'esame non deve assumere antibiotici, 2 settimane prima non deve assumere fermenti lattici o lassativi o praticato clisteri di pulizia intestinale (in caso di dubbi porti con sé le confezioni dei farmaci assunti o la prescrizione del medico curante);

se assume altri farmaci (ad esempio antidepressivi) potrà continuare ad assumerli regolarmente; è opportuno, tuttavia, consultare il personale del Laboratorio per assicurarsi che questi farmaci non interferiscano con i risultati del breath test;

se è diabetico in trattamento con insulina, la mattina dell'esame, dovendo rimanere a digiuno, utilizzerà solo metà della dose usuale; se assume ipoglicemizzanti orali, non dovrà assumerli la mattina in cui eseguirà l'esame;

il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con:

COLAZIONE: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi.

PRANZO: pasta comune o riso conditi con olio e un cucchiaino di grana (N.B. il parmigiano reggiano non contiene lattosio) oppure pastina in brodo vegetale, a scelta carne o pesce ai ferri conditi con olio.

SPOMERIGGIO: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi.

CENA: riso condito con olio e 1 cucchiaino di grana, uova, carne o pesce ai ferri.

BEVANDE: acqua naturale o minerale non gassata, the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati.

la mattina dell'esame dovrà rimanere a digiuno; potrà bere solo acqua naturale non gassata fino a 2 ore prima dell'esame;

prima di recarsi in Laboratorio lavi accuratamente i denti con spazzolino e dentifricio e risciacqui il cavo orale con un collutorio (tipo clorexedina allo 0,2% diluita) che poi eliminerà con un risciacquo finale di acqua;

Se è un fumatore dovrà smettere di fumare almeno dalla sera precedente;

Durante l'esecuzione del test dovrà raccogliere dei campioni di espirato prima e ad intervalli regolari di 15' dopo aver bevuto una bustina da 5 g. di Laevolac EPS. Non potrà consumare alcun cibo compresi chewing-gum e caramelle), fumare, dormire o seguire attività fisica; dovrà riferire al personale di Laboratorio eventuali sintomi insorti durante l'esecuzione del breath test con l'ora esatta in cui si sono verificati.

Al termine dell'indagine potrà riprendere l'alimentazione usuale e riprendere le sue normali occupazioni..

Il presente documento è di proprietà ed uso esclusivo del Laboratorio Pennetti snc di Barletta. Esso NON può essere copiato o riprodotto in alcun modo e NON può essere esibito o prestato a terzi parzialmente senza il consenso scritto della società.

UREA (HP)

permanenza in laboratorio per circa 30 minuti

L'Urea Breath Test è un metodo rapido, specifico, sensibile non invasivo per valutare la presenza di Helicobacter pylori (HP) nella mucosa gastrica.

FARMACO UTILIZZATO

Expirobacter Sofar Spa (13C Urea 100 mg); Compresa solubile disciolta in una soluzione nella quale è stata appena disciolta una bustina da 1,4 g. di acido citrico contenuta nel kit, utilizzato per rallentare lo svuotamento gastrico.

COME FUNZIONA

Il test si basa sulla somministrazione per via orale di urea, cioè un composto sintetico e quindi non di derivazione umana.

PREPARAZIONE PRIMA DELL'ESAME

3 settimane prima dell'esame non deve assumere antibiotici, associati e inibitori della pompa protonica.

1 settimana prima non deve assumere farmaci gastroprotettori deve essere a digiuno da 6 ore se adulto, da 3 ore se bambino.

ELENCO FARMACI GASTROPROTETTORI

ANTRA (Omeprazolo)	PARIET (Rabeprazolo)
AXAGON (Esomeprazolo)	PEPTAZOL (Pantoprazolo)
BIOMAG (Cimetidina)	RANIBEN (Ranitidina)
BRUMETIDINA (Cimetidina)	RANIBLOC (Ranitidina)
CITIMID (Cimetidina)	RANIDIL (Ranitidina)
CRONIZAT (Nizatidina)	RANIDIZ (Ranitidina)
DINA (Cimetidina)	STOMET (Cimetidina)
EURECEPTOR (Cimetidina)	TAGAMET (Cimetidina)
FAMODIL (Famotidina)	TEMIC (Cimetidina)
GASTRIDIN (Famotidina)	ULCEDIN (Cimetidina)
LANSOX (Lansoprazolo)	ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina)
LEBLON (Pirenzepina)	ULCEX (Ranitidina)
LIMPIDEX (Lansoprazolo)	ULCODINA (Cimetidina)
LOSEC (Omeprazolo)	ULCOMEDINA (Cimetidina)
MEPRAL (Omeprazolo)	ULIS (Cimetidina)
NIZAX (Nizatidina)	ZANIZAL (Nizatidina)
NOTUL (Cloridrato di Cimetidina)	ZANTAC (Ranitidina)
OMEPRAZEN (Omeprazolo)	ZOTON (Lansoprazolo)
PANTECTA (Pantoprazolo)	
PANTOPAN (Pantoprazolo)	
PANTORC (Pantoprazolo)	

Il presente documento è di proprietà ed uso esclusivo del Laboratorio Pennetti snc di Barletta. Esso NON può essere copiato o riprodotto in alcun modo e NON può essere esibito o prestato a terzi parzialmente senza il consenso scritto della società.

le nostre attenzioni per la tua salute non finiscono qui, gira il volantino

