

UREA BREATH TEST: LA SALUTE IN UN SOFFIO

LATTOSIO	UREA (HP)		
Euro 60,00	Euro 40,00		
Permanenza in laboratorio per circa 4 ore	Permanenza in laboratorio per circa 30 minuti		
Il Breath Test al Lattosio è un test molto semplice che comporta la permanenza in laboratorio per quattro ore. Al fine di garantire l'adeguata accuratezza del test deve seguire le istruzioni di seguito indicate: - non deve aver assunto antibiotici nelle ultime 2 settimane; non deve aver assunto fermenti lattici o lassativi o praticato clisteri di pulizia intestinale nell'ultima settimana (in caso di dubbi porti con sé le confezioni dei farmaci assunti o la prescrizione del medico curante); - il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con: COLAZIONE: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi. PRANZO: pasta comune o riso conditi con olio e un cucchiaino di grana (N.B.: il parmigiano reggiano non contiene lattosio) oppure pastina in brodo vegetale, a scelta carne o pesce ai ferri conditi con olio. POMERIGGIO: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi. CENA: riso condito con olio e 1 cucchiaino di grana, uova, carne o pesce ai ferri. BEVANDE: acqua naturale o minerale non gassata, the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati. - dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame il paziente DEVE osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua); - dalle ore 7.00 del giorno dell'esame il paziente DEVE bere due bicchieri d'acqua, restare a digiuno, non fumare, lavarsi i denti ed eseguire risciacqui della cavità orale per 2 minuti con collutorio a base di clorexidina 0,2 %, non svolgere attività fisica. Durante l'esecuzione del test Le verrà chiesto di raccogliere dei campioni di espirato prima e ad intervalli regolari di 30' dopo aver bevuto una soluzione contenente 25 g di lattosio Durante l'esecuzione dell'esame non potrà consumare alcun cibo (compresi chewing-gum e caramelle), fumare, dormire o eseguire attività fisica; dovrà riferire al personale di Laboratorio eventuali sintomi insorti durante l'esecuzione del breath test con l'ora esatta in cui si sono verificati. Al termine dell'indagine potrà riprendere l'alimentazione usuale e riprendere le sue normali occupazioni.	L'Urea Breath Test è un metodo rapido, specifico, sensibile, non invasivo per valutare la presenza di Helicobacter Pylori (HP) nella mucosa gastrica. COME FUNZIONA Durante l'esecuzione del test Le verrà chiesto di raccogliere un campione di espirato 30 minuti dopo aver bevuto una soluzione contenente urea. PREPARAZIONE PRIMA DELL'ESAME Il paziente non deve assumere antibiotici associati e inibitori della pompa protonica nelle tre settimane precedenti l'esame ed alcun farmaco gastroprotettore nell'ultima settimana prima dell'esame. Deve essere a digiuno da 6 ore se adulto, da 3 ore se bambino. ELENCO FARMACI GASTROPROTETTORI <table> <tr> <td> ANTRA (Omeprazolo) AXAGON (Esomeprazolo) BIOMAG (Cimetidina) BRUMETIDINA (Cimetidina) CITIMID (Cimetidina) CRONIZAT (Nizatidina) DINA (Cimetidina) EURECEPTOR (Cimetidina) FAMODIL (Famotidina) GASTRIDIN (Famotidina) LANSOX (Lansoprazolo) LEBLON (Pirenzepina) LIMPIDEX (Lansoprazolo) LOSEC (Omeprazolo) MEPRAL (Omeprazolo) NIZAX (Nizatidina) NOTUL (Cloridrato di Cimetidina) OMEPRAZEN (Omeprazolo) PANTECTA (Pantoprazolo) PANTOPAN (Pantoprazolo) PANTORC (Pantoprazolo) </td><td> PARIET (Rabeprazolo) PEPTAZOL (Pantoprazolo) RANIBEN (Ranitidina) RANIBLOC (Ranitina) RANIDIL (Ranitidina) RANIDIZ (Ranitidina) STOMET (Cimetidina) TAGAMET (Cimetidina) TEMIC (Cimetidina) ULCEDIN (Cimetidina) ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina) ULCEX (Ranitidina) ULCODINA (Cimetidina) ULCOMEDINA (Cimetidina) ULIS (Cimetidina) ZANIZAL (Nizatidina) ZANTAC (Ranitidina) ZOTON (Lansoprazolo) </td></tr> </table>	ANTRA (Omeprazolo) AXAGON (Esomeprazolo) BIOMAG (Cimetidina) BRUMETIDINA (Cimetidina) CITIMID (Cimetidina) CRONIZAT (Nizatidina) DINA (Cimetidina) EURECEPTOR (Cimetidina) FAMODIL (Famotidina) GASTRIDIN (Famotidina) LANSOX (Lansoprazolo) LEBLON (Pirenzepina) LIMPIDEX (Lansoprazolo) LOSEC (Omeprazolo) MEPRAL (Omeprazolo) NIZAX (Nizatidina) NOTUL (Cloridrato di Cimetidina) OMEPRAZEN (Omeprazolo) PANTECTA (Pantoprazolo) PANTOPAN (Pantoprazolo) PANTORC (Pantoprazolo)	PARIET (Rabeprazolo) PEPTAZOL (Pantoprazolo) RANIBEN (Ranitidina) RANIBLOC (Ranitina) RANIDIL (Ranitidina) RANIDIZ (Ranitidina) STOMET (Cimetidina) TAGAMET (Cimetidina) TEMIC (Cimetidina) ULCEDIN (Cimetidina) ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina) ULCEX (Ranitidina) ULCODINA (Cimetidina) ULCOMEDINA (Cimetidina) ULIS (Cimetidina) ZANIZAL (Nizatidina) ZANTAC (Ranitidina) ZOTON (Lansoprazolo)
ANTRA (Omeprazolo) AXAGON (Esomeprazolo) BIOMAG (Cimetidina) BRUMETIDINA (Cimetidina) CITIMID (Cimetidina) CRONIZAT (Nizatidina) DINA (Cimetidina) EURECEPTOR (Cimetidina) FAMODIL (Famotidina) GASTRIDIN (Famotidina) LANSOX (Lansoprazolo) LEBLON (Pirenzepina) LIMPIDEX (Lansoprazolo) LOSEC (Omeprazolo) MEPRAL (Omeprazolo) NIZAX (Nizatidina) NOTUL (Cloridrato di Cimetidina) OMEPRAZEN (Omeprazolo) PANTECTA (Pantoprazolo) PANTOPAN (Pantoprazolo) PANTORC (Pantoprazolo)	PARIET (Rabeprazolo) PEPTAZOL (Pantoprazolo) RANIBEN (Ranitidina) RANIBLOC (Ranitina) RANIDIL (Ranitidina) RANIDIZ (Ranitidina) STOMET (Cimetidina) TAGAMET (Cimetidina) TEMIC (Cimetidina) ULCEDIN (Cimetidina) ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina) ULCEX (Ranitidina) ULCODINA (Cimetidina) ULCOMEDINA (Cimetidina) ULIS (Cimetidina) ZANIZAL (Nizatidina) ZANTAC (Ranitidina) ZOTON (Lansoprazolo)		

UREA BREATH TEST: LA SALUTE IN UN SOFFIO

LATTULOSIO	Euro 60,00	GLUCOSIO	Euro 60,00
Permanenza in laboratorio per circa 4 ore		Permanenza in laboratorio per circa 2 ore	
Il Breath Test Lattulosio è un test molto semplice che comporta la permanenza in laboratorio per circa quattro ore. Al fine di garantire l'adeguata accuratezza del test deve seguire le istruzioni di seguito indicate: - non deve aver assunto antibiotici nelle ultime 4 settimane; non deve aver assunto fermenti lattici o lassativi o praticato clisteri di pulizia intestinale nelle ultime 2 settimane (in caso di dubbi porti con sé le confezioni dei farmaci assunti o la prescrizione del medico curante); - se assume altri farmaci (ad esempio antipertensivi) potrà continuare ad assumerli regolarmente; è opportuno, tuttavia, consultare il personale del Laboratorio per assicurarsi che questi farmaci non interferiscano con i risultati del breath test; - se è diabetico in trattamento con insulina, la mattina dell'esame, dovendo rimanere a digiuno, utilizzerà solo metà della dose usuale; se assume ipoglicemizzanti orali, non dovrà assumerli la mattina in cui eseguirà l'esame; - il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con: COLAZIONE: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi. PRANZO: pasta comune o riso conditi con olio e un cucchiaino di grana (N.B.: il parmigiano reggiano non contiene lattosio) oppure pastina in brodo vegetale, a scelta carne o pesce ai ferri conditi con olio. POMERIGGIO: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi. CENA: riso condito con olio e 1 cucchiaino di grana, uova, carne o pesce ai ferri. BEVANDE: acqua naturale o minerale non gassata, the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati. - la mattina dell'esame dovrà rimanere a digiuno; potrà bere solo acqua naturale non gassata fino a 2 ore prima dell'esame; - prima di recarsi in Laboratorio lavi accuratamente i denti con spazzolino e dentifricio e risciacqui il cavo orale con un collutorio (tipo clorexedina allo 0.2% diluita) che poi eliminerà con un risciacquo finale con acqua; - se è un fumatore dovrà smettere di fumare almeno dalla sera precedente; Durante l'esecuzione del test Le verrà chiesto di raccogliere dei campioni di espirato prima e ad intervalli regolari dopo aver somministrato una dose contenente 10g (pari a 16 ml) di Lattulosio. Durante l'esecuzione dell'esame non potrà consumare alcun cibo (compresi chewing-gum e caramelle), fumare, dormire o eseguire attività fisica; dovrà riferire al personale di Laboratorio eventuali sintomi insorti durante l'esecuzione del breath test con l'ora esatta in cui si sono verificati. Al termine dell'indagine potrà riprendere l'alimentazione usuale e Riprendere le sue normali occupazioni		Il Breath Test Glucosio è un test molto semplice che comporta la permanenza in laboratorio per circa due ore. Il paziente al fine di garantire l'adeguata accuratezza del test, deve seguire le istruzioni di seguito indicate: - nei sette giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi; - il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante; - il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con: COLAZIONE: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi. PRANZO: pasta comune o riso conditi con olio e un cucchiaino di Grana (N.B.: il parmigiano reggiano non contiene lattosio) oppure pastina in brodo vegetale, a scelta carne o pesce ai ferri conditi con olio. POMERIGGIO: the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati fette biscottate o pane comune o pane tostato o biscotti secchi. CENA: riso condito con olio e 1 cucchiaino di grana, uova, carne o pesce ai ferri. BEVANDE: acqua naturale o minerale non gassata, the o caffè leggero o caffè d'orzo zuccherati. - dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame il paziente DEVE osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua); - dalle ore 7.00 del giorno dell'esame il paziente DEVE bere due bicchieri d'acqua, restare a digiuno, non fumare, non lavarsi i denti, non svolgere attività fisica. Durante l'esecuzione del test Le verrà chiesto di raccogliere dei campioni di espirato prima e ad intervalli regolari di 15' dopo aver bevuto una soluzione contenente 50 g di glucosio. Durante l'esecuzione dell'esame non potrà consumare alcun cibo (compresi chewing-gum e caramelle), fumare, dormire o eseguire attività fisica; dovrà riferire al personale di Laboratorio eventuali sintomi insorti durante l'esecuzione del breath test con l'ora esatta in cui si sono verificati. Al termine dell'indagine potrà riprendere l'alimentazione usuale ed riprendere le sue normali occupazioni.	